

ASPECTE PARTICULARE ALE TRICHINELOZEI ÎN ZONA OLTENIEI. STUDIU CLINICO-EPIDEMIOLOGIC ȘI HISTOLOGIC

*D.Hurezeanu, F.Bogdan, Doina Ene, Mioara Cotulbea, Livia Dragomu,
Carmen Canciovici*

Clinica de Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină, Craiova

Au fost studiate cazurile de trichineloză internate în Clinica de Boli Infecțioase din Craiova în două perioade de timp (1983-1987 și 1990-1994), în dorința unui studiu comparativ. Rezultatele obținute au relevat un important polimorfism clinic, o creștere de cca zece ori a incidenței în a doua perioadă de studiu, o prevalență a persoanelor de sex feminin din mediul urban, aparținând grupei de vârstă 20-40 ani, și un număr foarte mic

de forme grave și letale (0,1-0,01%). Infectarea umană variază cu intensitatea infestării sursei animale, ține de obiceiuri culinare și de gradul de respectare și aplicare al legislației sanitaro-veterinare. Este de remarcă că în cadrul aceluiași grup de consumatori de carne infestată, nu toți fac boala, unele persoane ne prezentând nici modificări biologice. Din punct de vedere histologic am reținut un aspect aparte al infestării cu trichinela, prin apariția (la trei cazuri) pe preparatele microscopice din biopsia de deltoid, a formei de parazit *Trichinella ablongata*, pe care noi am considerat-o ca o formă nouă care se introduce în arealul nostru, sau fiind o modalitate de adaptare a parazitului prin modificări ale morfologiei. Facem această subliniere, pentru că din punct de vedere clinico-epidemiologic nu au existat diferențe evolutive la persoanele infectate cu cele două tipuri de trichinele.