

ASPECTS PARTICULAIRES DE LA TRICHINELLOSE EN OLTENIE. ÉTUDE CLINIQUE-ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET HISTOLOGIQUE

*D.Hurezeanu, F.Bogdan, Doina Ene, Mioara Cotulbea, Livia Dragomir,
Carmen Canciovici*

Clinique des Maladies Infectieuses,
Faculté de Médecine, Craiova

Les cas de trichinellose hospitalisés dans la Clinique de Maladies Infectieuses de Craiova ont été étudiés en deux périodes de temps (1983-1987 et 1990-1994) dans le desir d'une étude comparatif. Les résultats obtenus ont révélés un important polymorphisme clinique, une amplification de dix fois environ de l'incidence dans la deuxième période d'étude, une prédominance des personnes féminins du milieu urbain, appartenant au groupe d'âge 20-40 (vingt-quarante) ans, et un très petit nombre de graves et létales formes (0,1-0,01). L'infestation humaine varie en fonction d'intensité de l'infestation de la source animale, elle tient à des habitudes culinaires et au degré de respect et d'application de la législation sanitaire vétérinaire. Il est à remarquer que dans le même groupe de consommateurs de chair infestée, toutes les gens ne contractent pas la maladie, certains ne présentant même pas de modifications biologiques. Du point de vue histologique nous avons retenu un aspect original de l'infestation la trichine, par l'apparition (à trois cas) sur les préparations microscopiques réalisées de la biopsie de deltoïde, de la forme de parasite *Trichinella ablongata*, que nous avons considérée comme une nouvelle forme qui s'introduit dans notre zone, en étant une modalité d'adaptation du parasite par des modifications de la morphologie. Nous soulignons cette idée parce que du point de vue clinique

- épidémiologique nous n'avons pas trouvé des différences évolutives aux personnes infectées avec les deux types de trichine.