

# ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ȘI CLINICE ÎN TRICHINELOZĂ

Ileana Brâncuș\*, L.Brâncuș\*\*

\*I.P.S.M.P.Dolj; \*\*Spitalul Nr.2 Craiova

Lucrarea este un studiu statistic urmărind incidența trichinelozei în județul Dolj pe o perioadă de 11 ani (1984-1994) a cazurilor spitalizate și a focarelor declarate. Incidența totală a cazurilor de trichineloză este exploziv crescută în ultimii ani după 1990 - parțial și prin exces de diagnostic. Cazuri mai frecvente în urban față de rural; maximul incidenței specifice se situează la grupa de vârstă 5-14 ani. În 91% cazuri îmbolnăvirea s-a produs după consum de carne de porc. 1% cazuri după consum carne porc mistreț și în 8% neidentificat. În toate cazurile formă gravă și cele cu deces s-a precizat consumul de carne neprelucrată termic. În anchetele epidemiologice, din totalul consumatorilor de carne infestată, 34,3% prezintă forme clinice de boală necesitând spitalizarea. Sindroamele clinice de debut sunt: forma miopatică cu edeme la 78% cazuri și formă diareică (sindrom diareic persistent) în 12% cazuri. Din cei spitalizați și dispensarizați ulterior, doar 14% prezintă simptome clinice și paraclinice asociate diagnosticului de trichineloză. Diagnosticul este pus pe date epidemiologice (examen trichineloscopic) în 61% din cazuri; date clinice corelate cu eozinofilie crescută în 78% cazuri și doar în 22% cazuri se confirmă prin diagnostic imunologic (reacție de precipitare circumlarvară).