

PARTICULARITĂȚI CLINICE ȘI TERAPEUTICE ALE TRICHINELOZEI ÎN PERIOADA 1990-1994 ÎN SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CONSTANȚA

Valentina Florea, Mariana Codarcea, Eugenia Muja, Georgeta Burugiu

Clinica de Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină, Constanța

Urmărind clinic evoluția trichinozelor în Județul Constanța în perioada 1990-1994 am observat un vârf epidemic în 1993. În 1990 au fost

19 cazuri; în 1991 am avut 29 cazuri; în 1992 - 31 cazuri distribuite egal pe grupe de vârstă și s-a ajuns în 1993 la un număr de 216 cazuri cu următoarea distribuție pe grupe de vârstă: 14 cazuri 1-4 ani; 27 cazuri 5-14 ani; 53 cazuri 15-24 ani; 38 cazuri 25-34 ani; 53 cazuri 35-44 ani; 20 cazuri 45-54 ani; 5 cazuri 55-64 ani și 2 cazuri 65-74 ani; în 1994 au fost 110 cazuri. Infestarea a predominat deci la vârsta tânără. Diagnosticul s-a stabilit pe criteriile clasice epidemiologice, clinice și de laborator. La circa 10% din bolnavi am observat în perioada stadiului invaziv în afara simptomatologiei obișnuite cu fenomene algice musculare, edeme, urticarie, tulburări neuropsihice, respiratorii și cardiace, apariția unor tulburări de vedere care s-au menținut 2-3 săptămâni. Unii pacienți au avut diplopie, unii scăderea acuității vizuale, alții fotofobie și scotoame. În timpul tratamentului acuzele au diminuat treptat. La cazurile foarte grave cu leucocitoză mare și eozinofilie (peste 15000-20000 leucocite și eozinofilie ce a evoluat între 11%-40%) au apărut polinevrite de tip ascendent LANDRI (persistente câteva luni). Au fost cazuri la care s-au diagnosticat pareze faciale și cazuri cu tetrapareze a căror evoluție a fost îndelungată și răspunsul la tratament tardiv. Un procent crescut de bolnavi - între 60-70% au prezentat reacția serică de precipitare circumscriasă pozitivă, concomitent cu pozitivarea IDR-ului la trichinelină la un interval cuprins între 30 și 60 zile de la infestare. La un lot restrâns de pacienți, cu forme grave de boală am administrat în premieră la adulți albendazol. Doza zilnică a fost de 300 mg în 2 prize egale. Durata tratamentului a fost între 5-7 zile. Am apreciat răspunsul la această medicație (pe care am asociat-o în general cu cortizon, calciu și vitamine) ca bună, iar față de cel la vermozol și mintezol la fel de eficient dar mai ieftin. Medicamentul a fost administrat în colaborare cu Inspectoratul Sanitar Veterinar Constanța.