

PARTICULARITES CLINIQUES ET TERAPEUTIQUES DANS TRICHINELLOSIS DANS L'INTERVAL 1990-1994 DANS L'HÔPITAL CLINIQUE MUNICIPAL CONSTANȚA

Valentina Florea, Mariana Codarcea, Eugenia Muja, Georgeta Burugiu

Clinique des Maladies Infectieuses,
Faculté de Médecine, Constanța

Suivant du point de vue clinique l'évolution des trichinellosis dans le département de Constanța dans la période 1990-1994, nous avons observé une pointe épidémique en 1993. En 1990 on a eu 19 cas; en 1991 - 29 cas; en 1992 - 31 cas distribues également par groupes d'âges et en 1993 un nombre de 216 cas avec la suivante distribution par groupes d'âges: 14 cas -

1-4 ans; 27 cas 5-14 ans; 53 cas 15-24 ans; 38 cas 25-34 ans; 53 cas 35-44 ans; 20 cas 45-54 ans; 5 cas 55-64 ans et 2 cas 64-74 ans. En 1991 110 cas. L'infection a prédominé donc a l'âge jeune. Le diagnostique a été établi par les critères classiques épidémiologiques, cliniques et de laboratoire. A 10% des malades on a observé dans la période de l'état invasif, sans la symptomatologie habituelle avec des phénomènes algiques des muscles, oedemes, urticaire, des troubles néuropsychiques, respiratoires et cardiologiques, on a eu des troubles de vue qui ont persistés 2-3 semaines: diplopie, la diminution de l'acuité visuelle, photophobie et des scotomes. Pendant le traitement tout cela a diminué. Aux cas très gravés avec leucocytose et eosinophilie (20000 leucocytes et 11%-40% eosinophilie) on a eu des polinevrites Landry (persistents quelques mois). Il y a eu quelques cas avec des paralysies faciales ou avec tétraparésie avec une longue évolution et la réponse difficile et tardive au traitement. 60-70% des malades ont eu la réaction sérique circulaire positive et eu même temps la IDR a trichinelline positive a 30 jusqu'à 60 jours du moment de l'infestation. A quelques malades avec des formes graves nous avons administré pour la première fois aux adultes l'albendazole. La dose journalière a été de 300 mg en 2 prises égales. La durée du traitement a été de 5-7 jours. Nous avons apprécié la réponse de cette médication (associée avec cortizone, calcium et vitamines) comme bonne et en comparaison avec le traitement avec vermox a été administré en collaboration avec L'Inspectorat Sanitaire Veterinaire Constanța.