

STUDIUL COMPARATIV AL EFICIENȚEI TERAPIEI CU THIABENDAZOL ȘI MEBENDAZOL ÎN 250 CAZURI DE TRICHINELOZĂ, CONFIRMATE BIOPTIC ȘI IMUNOENZIMATIC

*L.Negruțiu, I.Iacobiciu, Rodica Potcoavă-Vasiliu, Narcisa Nicolescu,
L.Sălăgean, I.Marincu*

Clinica de Boli Infecțioase; Catedra de Parazitologie,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Timișoara;
Institutul "I.C.Cantacuzino", București

Studiul nostru compară eficiența terapeutică a medicației antiparazitare cu Thiabendazol și Mebendazol pe 2 loturi a câte 125 pacienți cu trichineloză, spitalizate pe o perioadă de 4 ani în Clinica de Boli Infecțioase Timișoara (1989-1994). Diagnosticul etiologic a fost precizat prin trichinescopia directă a eșantioanelor musculare bioptice și metode imunoenzimatice ELISA și RPL (90 cazuri investigate prin Laboratorul de Parazitologie - Institutul "I.C.Cantacuzino" - București. Monitorizarea clinico-biologică a unor parametri evolutivi permite efectuarea comparativă a markerilor terapeutice obținute cu cele două tipuri de medicație la pacienții noștri.