

CONCORDANCE ENTRE LE DIAGNOSTIQUE ECOGRAPHIQUE ET CELUI CHIRURGICAL DANS L'ICTERE OBSTRUCTIF

*T.Negomireanu, Carmen Canciovici, Livia Dragonu, Ada Gârniță,
L.Gârniță*

Clinique des Maladies Infectieuses,
Faculté de Médecine, Craiova

Durant une période de trois ans on a réalisé l'écographie abdominale des malades hospitalisés comme suspecte de hépatite aiguë virale pour un syndrome ictérique. Parmi les cas soumis à l'examen, on a retenu 114 malades pour lesquels on a présupposé un ictère par obstruction mécanique. Les malades étaient d'âge et de sexe différentes et on proposé l'intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale a été acceptée et réalisée pour 76 (67%) des malades. L'obstruction mécanique a été confirmée dans tous les cas soumis à l'intervention, une concordance étiologique existant dans

84,21% des cas. Cette confirmation a été de 100% des cas de kyste hydatique hépatique, de 90,91% des cas de néoplasme des voies biliaires et de 77,78% des cas de lithiase biliaire. Pour les autres cas, l'obstruction mécanique était présente, mais autre que celle suggérée échographiquement. Tenant compte des avantages que la méthode échographique (simple, noninvasive, économique, facilement acceptée par le malade etc.), on la recommande comme méthode de routine et d'intérêt majeur dans les cas de syndrome ictérique suspects d'une cause obstructive.