

DATE CU PRIVIRE LA RANDAMENTUL DOLORIMETRIEI EXTERNE IN OBSTETRICA

Lóránd Sándor, Wicinsky Ryszárd

(Magyar Nőorvosok Lapja, 1957, no. 4—5, p. 209).

Autorii au făcut un examen comparativ al gradului de siguranță pe care îl prezintă cele două metode de determinare cantitativă a activității dureroase a ute-

rului: randamentul orar al lui *Lóránd* și indicele de activitate al lui *Wicinsky*.

Determinarea cantitativă a activității dureroase ne dă posibilitatea să stabilim

durata nașterii și să alegem momentul optim de terminare a ei.

Autorii au pregătit tocograme cu topograful Lóránd, folosind materialul selecționat la 123 de femei primipare și la 87 de femei multipare (mai ales în cazuri de nașteri anormale, la două clinici).

Rezultatele examinărilor arată că între cele două metode de determinare cantitativă nu există practic decît o deosebire minimă; ambele pot fi utilizate deopotrivă.

Indicele de activitate dureroasă al lui Wicinsky solicită un procedeu de calcul

mai minuțios, prezentînd mai cu seamă un interes teoretic, în timp ce randamentul contrar al lui Lóránd este mai adecvat scopurilor practice.

Rezultatele cercetărilor dovedesc fără excepție că deși dolorimetria externă nu înregistrează decît fenomenele parțiale ale activității uterului, totuși se pot trage concluzii foarte interesante în legătură cu mersul nașterii. Aceste concluzii sînt cu mult mai sigure decît concluziile simple ale oricărui ginecolog cu experiență, bazate pe palparea uterului în activitate.

LORINCZ E. ANDRAS